

# DRAKER RTU

**Микрокапсулиран течен инсектицид/акарицид**  
**Готов за употреба**  
**За масова и професионална употреба**

## DRAKER RTU

### СЪСТАВ

100 грама от продукта съдържат:

Циперметрин (CAS № 52315-07-8)	0,3 g
Тетраметрин (CAS № 7696-12-0)	0,06 g
Пиперонил бутоксид (CAS № 51-03-6)	0,3 g
Допълващи съставки до	100 g



Внимание

### Предупреждения за опасност:

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

### Препоръки за безопасност:

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P103 Преди употреба прочетете етикета.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P391 Съберете разлятото.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

**VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l.**

**Via Desman 43 – 35010 Borgoricco (PD), Italy**

**Производствено предприятие: VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l.** - Via Desman 43 – 35010 Borgoricco (PD), Italy; Тел. +39 049/933711-[www.vebi.it](http://www.vebi.it)

**Дистрибутор:** Възраждане-Касис ООД; Булевард България 102, Ловеч, 5500, България, Тел: +35968604111, [www.vkasis.com](http://www.vkasis.com)

**№ на разрешението:** 2422-2/08.10.2018 г.

Съдържание: За масова употреба – 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000 ml.

За професионална употреба - 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 2 L, 3 L, 5 L, 20 L

Партиден номер:.....дата:..... Годен до:.....Срок на годност: 3 години

**КОНТЕЙНЕРЪТ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПОВТОРНО**

Биоцид за контрол на летящи (комари, мухи, молци) и пълзящи (хлебарки, мравки, бълхи, миризливки) насекоми и акари на закрито в сгради и на открито.

### НАЧИН НА УПОТРЕБА

Биоцидът е готов за употреба микрокапсулиран течен инсектицид/акарицид. Убива насекомите, които са налични към момента на третирането и има остатъчна ефективност от 2 седмици.

Преди обработка помещенията да се освободят от хора, домашни животни, храни, напитки и др. Да се отстранят или покрият аквариуми, терариуми и клетки за животни. Да се изключи въздушният филтър на аквариума.

Биоцидът се прилага както е описано в таблицата:

Целеви видове	Начин на употреба
<b>Комари (вкл. тигрови комари)</b>	Обработват се местата където кацат комарите. На открито: под растения - храсти и високи треви, долната страна на листата на дървета и храсти. Също така, стрехи на сгради, под веранди и тераси и влажни сенчести места. Да се избягва обработката на цъфтящи растения. На закрито: на тъмни, влажни места, напр. под мивки, в тоалетни, в перални помещения, зад мебелите, в горната част и ъглите на помещенията.
<b>Мухи</b>	Обработват се местата където кацат мухите: стени, тавани и первази на прозорци.
<b>Пълзящи насекоми (хлебарки, мравки, миризливки) и молци</b>	Обработват се кухни и бани, в близост до източници на храна и вода, вградени шкафове, гардероби, тоалетни, панти и каси на врати, цепнатини и пукнатини, кухни в стените, около и под електроуреди и оборудване, в и около струпани предмети (кашони, картони, хартии и т.н.).
<b>Бълхи, акари</b>	На закрито: обработват се местата на които бълхите/акарите се крият: завеси, килими, зад и под мебели. Преди обработка на деликатни материали като коприна и плат, да се тества съвместимостта на продукта на малка скрита област.  Да не се обработват тъкани, които влизат в контакт с кожата.

Разходна норма: 500 ml/20 – 30 квадратни метра.

Да не се пръска продукта във въздуха. Да се обработват само повърхности. Да се пръска само на места, недостъпни за деца и домашни животни. Да не се използва директно върху животни. Да не се използва при земеделски култури. Да не се замърсяват храна, напитки или техните опаковки по време на употреба. Да се избягва вдишването на спрея. След работа с биоцида, ръцете да се измият.

**Интервал между отделните третираня:** В случай на повторно размножаване на насекоми, третирането може да бъде повторено. Биоцидът има остатъчно действие от 2 седмици.

**Достъп на хора и животни до третираните зони:** След изсъхване на повърхностите и добро проветряване в продължение на не по-малко от 1 час.

След третиране на открито, да се изчака 30 минути след третирането, за да се разнесе спрея. След третиране на открито на тревни площи, достъпът е разрешен след 24 часа.

#### **НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ**

Продуктът е комбинация от следните активни вещества: ЦИПЕРМЕТРИН 0,3%, ТЕТРАМЕТРИН 0,06% и ПИПЕРОНИЛ БУТОКСИД 0,3%, които, поотделно, водят до следните симптоми на отравяне:

**ЦИПЕРМЕТРИН и ТЕТРАМЕТРИН:** СИМПТОМИ: блокиране предаването на нервни импулси, пре- и пост-синаптично хипер-стимулиране на нервните окончания. Пациентите с алергии и астма, както и децата, са особено чувствителни.

Симптоми, които засягат централната нервна система: тремори, конвулсии, атаксия; дразнене на дихателните пътища: ринорея, кашлица, бронхоспазми и затруднения в дишането; отключени алергични реакции: анафилаксия, прегряване, потене, оток на кожата, периферен съдов колапс.

Лечение: прилагане на симптоматично лечение и изкуствено дишане.

**ПИПЕРОНИЛ БУТОКСИД** - Лечение: прилагане на симптоматично лечение.

**Предупреждения: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ. РАЗКЛАТЕТЕ ДОБРЕ КОНТЕЙНЕРА ПРЕДИ УПОТРЕБА**

**ДА НЕ СЕ ПРОДАВА В НАСИПНО СЪСТОЯНИЕ**