

MURIN PELLETT EXTREME

Готова за употреба родентицидна примамка
под формата на пелети
ЗА МАСОВА УПОТРЕБА
КАТЕГОРИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ: МАСОВА

Състав:

100 г продукт съдържат:
Бродифакум (CAS № 56073-10-0) 0,0025 г
Денатониум бензоат (CAS № 3734-33-6) 0,001 г
Овкусител и допълващи съставки до 100 г



Внимание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

H373 Може да причини увреждане на органите (кръв)
при продължителна или повтаряща се експозиция.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в
ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.
P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция:
Потърсете медицински съвет/помощ.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в
съответствие с нормативната уредба.

БИОЦИД (Продуктов тип 14)
Разрешение за предоставяне на пазара

№ 2386-1/11.06.2018 г.

Лице, което предоставяне на пазара биоцида и
производител:

VEBI Istituto Biochimico s.r.l., Via Desman 43 – 35010
Borgoricco-Padova, Италия
Тел: +39 049/9337111 - www.vebi.it

Дистрибутор: Възраждане-Касис ООД; Булевард
България 102, Ловеч, 5500, България, Тел:
+35968604111 - www.vkasis.com

Опаковка: Опаковки до 150 г, (съдържащи
родентицидна примамка под форма на пелети в малки
опаковки от по 10 г, 15 г и 20 г всяка)

Срок на годност: 2 години от датата на производство.

Партида №:

УКАЗАНИЯ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

Този продукт съдържа антикоагулантно вещество. Ако
бъде погълнат, е възможно — с евентуално забавяне —
да се появят симптоми от рода на кръвотечение от носа
и венците. В тежки случаи може да се появят синини и
кръв в изпражненията или урината.

Антидот: Витамин К1, (прилага се под наблюдението на
лекар/ветеринарен лекар).

При:

Контакт с кожата: да се измие с вода и след това с вода
и сапун.

Контакт с очите: да се промият с течност за промивка на
очи или вода, клепачите да се държат отворени поне 10
минути.

Контакт с устата: да се изплакне внимателно с вода.

Нищо не трябва да се дава в устата на човек в
безсъзнание. Не предизвиквайте повръщане.

При инцидентно поглъщане незабавно да се потърси
лекарски съвет и да се покаже опаковката или етикета.
Обърнете се към ветеринарен лекар при поглъщане от
домашен любимец.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MURIN PELLETT EXTREME е готова за употреба
родентицидна примамка, съдържаща бродифакум.
Ефективна е срещу мишки и плъхове, дори след
еднократен прием. Препаратът под формата на пелети е
привлекателен за всички видове гризачи, за които е
предназначен.

Продуктът не предизвиква подозрителност в гризачите.
MURIN PELLETT EXTREME може да се използва в и
около производствени сгради, обществени сгради,
жилища, мазета, гаражи, складове и депа за отпадъци.

ЦЕЛЕВИ ВИДОВЕ

За контрол числеността на синантропни гризачи:
домашна мишка (*Mus musculus*) и сив плъх (*Rattus
norvegicus*).

Може да се използва вътре в сгради и около тях (до 0,5
m от стените им).

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

MURIN PELLETT EXTREME готова за употреба
родентицидна примамка под формата на пелети.
Може да се използва вътре в сгради и около тях (до 0,5
m от стените им).

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Прочетете и спазвайте информацията за продукта и
данните, придружаващи продукта или предоставени на
мястото на продажба, преди да го използвате.

Преди началото на третиране с отровната примамка е
необходимо да се идентифицират видовете гризачи,
вероятните причини за нападението и интензитета му.
Да се отстранят лесно достъпните източници на храна и
вода за гризачите, за да се подобри приемането на
продукта и да се намали вероятността от повторна
инвазия. Обектът не трябва да се почиства
непосредствено преди третирането с биоцида, за да не
се обезпокои популацията на гризачите, което би
затруднило приемането на отровната примамка.
Продуктът трябва да се използва само като част от
система за интегриран контрол на вредители, включващ
освен всичко друго мерки за хигиена и при възможност
нехимични методи за контрол (например използването
на капани).

Родентицидът се поставя в дератизационни кутии,
защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който
свежда до минимум риска от случайно поглъщане на
препарата от деца и нецелесъобразни животни. Примамките се
фиксираат се вътре в отровната точка, за да не бъдат
разпилявани от гризачите. Дератизационните кутии
трябва да са снабдени с маркировка, която ясно показва,
че съдържат родентицид и не трябва да се отварят,
повреждат или преместват. Те се поставят в засегнатите
от гризачи зони и помещения, близо до дупките им, по
маршрутите им на движение и местата, които основно
предпочитат. Където е възможно, кутиите трябва да се
закрепват за земята или за други конструкции, както и да
се поставят на места, защитени от наводняване.
Надписът върху тях трябва да съдържа следната
информация: търговското име на родентицида и номера
на разрешението за предоставяне на пазара на
продукта; името на активното вещество и

концентрацията му в продукта; както и следните предупреждения: „Съдържа родентицид (отрова)“; „Да не се отваря и премества“; „В случай на отравяне незабавно се обадете в Център по токсикология (тел. +359 2 9154 409)“.

Дератизационните кутии не се мият между отделните зареждания. Ако приемането на примамката е сравнително слабо, въпреки установената висока численост на вредителите, е необходимо дератизационните кутии да се преместят на други места или да се използва родентицид с друга формулация. Продуктът не е предназначен за дълготрайна употреба и не се използва като постоянни отровни точки. Обработката продължава максимум 35 дни. Ако през целия период на третиране примамките продължават да се изядат и не се наблюдава спад в числеността на гризачите, трябва да се определи вероятната причина за това. След като се изключат другите възможности, най-вероятно става дума за резистентни гризачи. Тогава трябва да се прецени възможността за употреба на неантикоагулантни или по-силни антикоагулантни родентициди, а също и използването на капани като алтернативна мярка за контрол.

Продуктът не трябва да се прилага директно върху почвата и в дупки на гризачи. Примамките не се използват за защита на селскостопански култури от гризачи. Да се избягва третиране с продукта при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се предотврати достъпа до примамката на деца, домашни любимци, селскостопански и други нецелеви животни. Бицидът е опасен за дивите животни. При употреба на обществени места третираните площи се маркират с поставяне на предупредителни табели, описващи риска от първични и вторични отравяния, както и мерките за оказване на първа помощ.

По време и след приключване периода на третиране всички остатъци от примамката се събират и отстраняват по безопасен начин в съответствие с изискванията на националното законодателство. По време на боравенето с продукта не трябва да се яде, пие и пуши. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на продукта с кожата. След употреба и преди хранене да се измиват ръцете и изложената кожа. Умрелите гризачи се премахват на чести интервали по време на дератизацията, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват или презареждат. При някои обстоятелства може да се изисква ежедневна проверка. Да се използват подходящи ръкавици при работа с умрели животни. Мъртвите гризачи се поставят в плътно затворени двойни пластмасови торби и се

предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД.

Да не се отварят пакетчетата, съдържащи примамката.

НОРМИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Мишки: 20 g - 40 g от примамката в една дератизационна кутия. Кутиите трябва да са разположени на разстояние минимум 5 m една от друга.

Плъхове: 100 g - 200 g от примамката в една дератизационна кутия. Кутиите трябва да са разположени на разстояние минимум 5 m една от друга. Заложените примамки трябва да се посещават често - поне веднъж на 2-3 дни (при обработки срещу мишки) или на 5 -7 дни (при обработки срещу плъхове) след началото на третирането и поне един път седмично след това, за да се провери дали се приемат от гризачите и да се презареждат, ако са изядени или повредени. Това продължава докато консумацията спре.

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА

Да се преценят и приложат възможните превантивни мерки (запушване на дупки, възможно най-пълно отстраняване на потенциалните места за хранене и пиене), за да подобри приемането на продукта и намали вероятността от повторно нахлуване на гризачи. Не използвайте антикоагулантни родентициди, като постоянни примамки (например за предотвратяване на нахлуване или следене на действията на гризачи). Продуктът трябва да се поставя в дератизационни кутии. Използването на този продукт следва да елиминира гризачите в срок от 35 дни. Информацията за продукта (т. е. етикет и/или брошура) трябва ясно да препоръчва на потребителя, в случай на неефективност на третирането (т. е. ако продължават да се забелязват действията на гризачи), да потърси съвет от доставчика на продукта или да се обади в служба за борба с вредители.

Търсете и отстранявайте мъртвите гризачи по време на третирането — най-малко при всяка проверка на дератизационните кутии. След приключване периода на третиране всички остатъци от примамката се събират и отстраняват по

безопасен начин в съответствие с изискванията на националното законодателство.

Да се съхранява на сухо, хладно и добре проветриво място.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца, птици, домашни и селскостопански животни.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Поради своето забавено действие, антикоагулантните отрови за гризачи дават резултат от 4 до 10 дни след поемането на примамката.

Гризачите могат да пренасят болести. Не докосвайте мъртви гризачи с голи ръце, използвайте ръкавици или инструменти от рода на щипци, когато ги изхвърляте.

Съдържа вгорчаващ агент, с цел предотвратяване на инцидентен прием от деца.